



سم موش کش ضد انعقادی

پستاف

ماده موثره :

برودیفاکوم (Brodifacoum)

ترکیب :

یک کیلو گرم از محتویات بسته حاوی ۰/۰۵ گرم برودیفاکوم مخلوط با قطعات پلت شده غلات و مواد جلب کننده چونندگان می باشد.

گروه شیمیایی :

ترکیب جدید ضد انعقادی (نسل دوم آنتی کوآگولانت ها)

خواص دارویی :

برودیفاکوم (Brodifacoum) بعنوان یک ماده ضدانعقادی قوی نسل دوم با جلوگیری از فعالیت آنزیم ردوکتاز در سیکل تبدیل ویتامین K1 اکسیوکساید به ویتامین K1 نهایتاً سبب کاهش ذخیره ویتامین K1 در بدن می شود. ویتامین K1 یکی از مواد ضروری جهت ساخت پیش ساز فاکتورهای انعقاد خون است بنابراین مصرف این سم مانع از انعقادخون و متعاقباً خونریزی داخلی و مرگ تدریجی می شود. بدنبال مصرف برودیفاکوم بعنوان یک آنتی کوآگولانت غیرمستقیم، علائم و نشانه های مسمومیت معمولاً چند روز پس از مصرف سم بروز مینماید، بنابراین موشهای دیگر متوجه نشده و همچنان بمصرف سم پستاف ادامه میدهند بنابراین احتمال بروز مقاومت در برابر مصرف این سم وجود ندارد. مصرف فقط یک وعده از سم پستاف باعث مرگ موش می شود.

موارد احتیاط :

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در محیطی با تهویه مناسب، دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- برای آبزیان و پرندگان بسیار سمی است.
- از دسترس دامهای اهلی دور نگهداشته شود.
- هنگام طمعه گذاری از ماسک، دستکش و لباس کار استفاده شود. اگر بوی انسان بروی طمعه باقی بماند موشها از خوردن آن خودداری میکنند.
- جهت احتیاط بیشتر هنگام طمعه گذاری از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز کنید.
- از خوردن سم، آلودگی مواد غذایی انسان و دام، تماس سم با پوست، چشم و لباس و استنشاق ذرات سم خودداری کنید.
- با توجه به اثر تاخیری این سم که معمولاً چندین روز پس از مصرف بروز می کند، در صورت بی احتیاطی و یا سوءاستفاده پس از مصرف سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
- به منظور جلوگیری از مسمومیت ثانویه، لاشه موشهای تلف شده جمع آوری و در صورت امکان سوزانده و یا دفن شود.
- ظروف و بسته های خالی سم را پس از سه بار شستشو سوراخ نموده و در محل مناسب دور از منابع آبی دفن نمایید.

کمکهای اولیه :

- در صورت خوردن سم بلافاصله با استفاده از روشهای رایج محتویات معده فرد مسموم شده تخلیه شود.
- در صورت تماس با پوست محل تماس را با آب و صابون بشویید.
- در صورت تماس با چشم با محلول شستشوی چشم یا آب تمیز و پاکیزه چندین بار چشم را بشویید.
- در موارد مسمومیت شدید سریعاً به پزشک مراجعه شود.

پادزهر :

در موارد مسمومیت، مصرف ویتامین K1 به صورت خوراکی یا تزریقی وریدی توصیه می شود.
بالغین : ۴۰ میلی گرم در روز (به صورت دزهای منقسم)
کودکان : ۲۰ میلی گرم در روز (به صورت دزهای منقسم)
درمان با ویتامین K1 ممکن است تا هفته ها و تا زمانی که انعقاد خون به حد ثابتی برسد همچنان ادامه یابد.
در موارد مسمومیت بسیار شدید ممکن است انتقال خون ضرورت یابد.

بسته بندی :

بسته های یک کیلو گرمی آماده مصرف.

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تاریخ تولید

اجازه واردات این سم به تصویب هیات نظارت برسموم رسیده است.



تهران- خیابان ۶۴ یوسف آباد- پلاک ۱۳ - طبقه دوم
تلفن : ۸۸۰۴۹۵۵۳ فکس : ۸۸۶۱۲۹۱۶

تولید کننده:

Animal Control Products Limited
New Zealand